



№ 22 / 16 Ιουλίου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία

ΠΕΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ **ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψώρα του San José** **(*Quadraspidotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae)**

- Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες).
- Δεν συνιστάται γενική καταπολέμηση.
- Μόνο σε σοβαρές προσβολές συστήνεται επέμβαση.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης:
 - ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 23-27 Ιουλίου
 - ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 9-13 Αυγούστου
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Fenoxycarb, Paraffin oil, Spirotetramat.

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Anarsia lineatella* Zeller - *Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 2^η πτήση των εντόμων από τις 12 Ιουλίου. Η έναρξη των ωτοκίων υπολογίζεται στις 16 Ιουλίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 21-22 Ιουλίου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής	Οπωρώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	*21-24 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	*30-31 Ιουλίου	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	*16-20 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	*25-27 Ιουλίου	Methoxyfenozide (3)	7
			Chlorantraniliprole (2)	14
			Diflubenzuron (2)	30
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	*21-24 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	*30-31 Ιουλίου	Emamectin (3)	3
			Beta-cyfluthrin (2)	7
			Cyfluthrin (1)	7
			Deltamethrin (2)	7
			Etofenprox (2)	7
			Lambda cyhalothrin (2)	7
			Spinosad (3)	7
			Indoxacarb (3)	10
			Chlorpyrifos (2)	20
Chlorpyrifos-methyl (1)	21			

- * μόνο για τις **ορεινές** περιοχές (υψόμετρο > 250μ).
- Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη